



ESTERILITZACIÓ EN LA GOSSA

Indicacions per a la esterilització

L'esterilització d'una gossa (*ovariohisterectomia*) presenta diferents avantatges, tant per als propietaris com per a la salut de l'animal, ja sigui preventivament o per al tractament d'algunes patologies. Les principals indicacions són:

☞ **Control de la reproducció:**

L'efecte més evident i de vegades el motiu principal pel qual realitzem l'esterilització de la nostra gossa és el control sobre la reproducció. Les gosses no esterilitzades entren en zel generalment dues vegades a l'any, durant el qual els augmenta el tamany vulvar i tenen pèrdues de sang. És durant aquests dies que hi ha risc de que la gossa tingui un embaràs no desitjat. L'esterilització és el mètode més eficaç per a prevenir-los, és irreversible i és el mètode amb menys efectes secundaris indesitjables. Altres mètodes com la injecció de productes hormonals són poc recomanables ja que afavoreixen l'aparició de neoplasies mamàries, infeccions de matriu, quistes ovàrics, entre altres.

☞ **Modificació del comportament sexual**

Apart d'eliminar els símptomes físics del zel, la esterilització elimina també el comportament de zel, com la tendència a escapar-se per a buscar la manera de aparellar-se, o l'atracció de mascles de la zona que intentin cobrir la nostra gossa durant les hores de passeig. La modificació del comportament de zel és més evident en cas dels mascles, però no deixa de ser un motiu important en les femelles.

☞ **Eliminació de l'aparició de certes patologies lligades als òrgans sexuals:**

Amb l'esterilització de la gossa s'aconsegueix que aquesta no tingui pseudolactacions (embaràs psicològic) o patologies com infeccions de matriu, hiperplasia quística endometrial, quistes i tumors ovàrics... Aquestes són patologies freqüents en gosses d'edat més avançada, ja que avui dia l'esperança de vida dels nostres animals ha augmentat considerablement. Són patologies que poden posar en perill la vida de la nostra mascota i que el tractament és quirúrgic. Com podem entendre, és millor realitzar una cirurgia preventiva en una gossa sana i jove, que no una cirurgia d'urgència en una gossa malalta i gran, on el risc anestèsic i de la cirurgia en si són més elevats.

☞ **Disminució del risc d'aparició de neoplàsies mamàries**

Si l'esterilització es realitza just abans o després del 1r zel, es disminueix molt el risc de que en un futur la gossa desenvolupi neoplàsies mamàries, que en

la gossa són malignes en un 40-50% dels casos. Com més tard realitzem la esterilització, més disminueix aquest avantatge.

☞ **Altres**

La esterilització també està indicada com a control de la diabetes, alguns problemes de pell, i com a tractament de les patologies abans esmentades (piometra, tumors ovàrics....)

Efectes secundaris no desitjables

Apart de les possibles complicacions intra i post operatòries inherents a qualsevol tipus de cirurgia, la ovariectomia pot provocar una major predisposició a la obesitat i incontinència urinària.

☞ **Obesitat**

L'obesitat predisposa a patir altres trastorns com problemes osteo-articulars, diabetes, major risc anestèsic/quirúrgic i en resum una esperança de vida més curta. Si bé és cert que els animals esterilitzats tenen major risc d'obesitat, aquest risc disminueix o desapareix si l'animal té una alimentació i activitat adequades després de la cirurgia.

Pel que fa a l'activitat, es recomana que facin l'exercici habitual i normal per a l'edat i tamany de cada gos, que ja hauria de fer abans de la cirurgia. Cada animal, segons raça i tamany, necessitarà fer més o menys exercici, però és convenient que de manera general surtin almenys 3 vegades al dia.

Pel que fa al tipus d'alimentació, es recomanen unes dietes (pinsos) específicament formulades per a animals esterilitzats, que tenen en compte aquest risc de obesitat. Són pinsos que tenen una major quantitat de fibres per augmentar l'efecte saciant, i menor quantitat de grasses. La nostra recomanació és el Royal Canin Neutered, adequat la gama segons edat i tamany de l'animal.

☞ **Incontinència urinària**

Un baix percentatge de les gosses poden desenvolupar incontinència urinària (generalment apareix 1 o 2 anys després de la cirurgia). Aquesta patologia es resol amb medicació. En la majoria de les gosses desapareix la incontinència amb l'administració del producte farmacològic adequat cada 2-3 dies.

“Llegendes urbanes”. És veritat que.....?

És veritat que és millor que les gosses pareixin una vegada abans de esterilitzar-les?

Rotundament, no. No és millor. El part o la cria de cadells no millora ni empitjora res. No és cert que el fet de alletar els cadells disminueixi el risc de

neoplàsies mamàries, en canvi sí que està demostrat que l'esterilització en l'edat adequada (just abans o després del 1r zel) sí que el disminueix. D'aquesta manera, si deixem passar varis zels a una gossa perquè la volem fer cadellar, estem disminuint (empitjorant) un dels avantatges que té l'esterilització.

És veritat que els canvia el caràcter després de esterilitzar-les?

Com hem explicat abans, amb l'esterilització desapareix el comportament sexual. És en aquest sentit que canvia el caràcter, però pel que fa a la resta, després de la cirurgia la nostra gossa continuarà sent la de sempre.

És veritat que s'engreixen molt?

En l'apartat anterior hem explicat els efectes indesitjables de l'esterilització. Com heu llegit, el risc d'obesitat augmenta en gosses esterilitzades, però no és inevitable que s'engreixin, sinó que podem controlar aquest risc amb unes pautes ben senzilles: una bona dieta i una mica d'exercici (exactament el mateix que ens recomanen a nosaltres... no?)

Esperem que aquesta informació us hagi resolt els dubtes que puguéssiu tenir respecte aquest tema. Si teniu qualsevol altre pregunta no dubteu a fer-nos-ho saber, us atendrem encantats.

**L'equip de veterinaris d' ANIMALIA.
www.animalia.cat
animalia@animalia.cat**